

# 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

## 追加（3回目）接種に使用するワクチンについて

武田／モデルナ社のワクチンも  
3回目の接種に使用できるようになりました



◎接種の対象 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

### ◎使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田／モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田／モデルナ社は半量になります。

### ◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

効果

ファイザー社及び武田／モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

| 発現割合     | ファイザー社（2回目→3回目接種後の症状）                                                                                   | 武田／モデルナ社（2回目→3回目接種後の症状）                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50%以上    | 疼痛（78.3→83.0%）、疲労（59.4→63.7%）                                                                           | 疼痛（88.3→83.8%）、 <b>疲労</b> （65.4→58.7%）<br>頭痛（58.8→55.1%）                                              |
| 10 - 50% | <b>頭痛</b> （54.0→48.4%）、 <b>筋肉痛</b> （39.3→39.1%）<br><b>悪寒</b> （37.8→29.1%）、 <b>関節痛</b> （23.8→25.3%）      | <b>筋肉痛</b> （58.1→49.1%）、 <b>関節痛</b> （42.9→41.3%）<br><b>悪寒</b> （44.3→35.3%）、 <b>リンパ節症</b> （14.2→20.4%） |
| 1 - 10%  | <b>38度以上の発熱</b> （16.4→8.7%）<br><b>腫脹</b> （6.8→8.0%）、 <b>発赤</b> （5.6→5.9%）<br><b>リンパ節症（※）</b> （0.4→5.2%） | <b>38度以上の発熱</b> （15.5→6.6%）<br><b>腫脹・硬結</b> （12.3→5.4%）<br><b>紅斑・発赤</b> （8.7→4.8%）                    |

（注）対象／人数：ファイザー2回目16～55歳/2,682人、ファイザー3回目18～55歳/289人、モデルナ2回目13歳以上/14,691人、モデルナ3回目18歳以上/167人

（注）2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。

（注）武田／モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

（※）ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典：特例承認に係る報告書より

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

### ◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田／モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

（※）武田／モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。

| ワクチンの組み合わせ   |              |              | 抗体価        |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1回目<br>ファイザー | 2回目<br>ファイザー | 3回目<br>モデルナ  | 抗体価は<br>上昇 |
| 1回目<br>ファイザー | 2回目<br>ファイザー | 3回目<br>ファイザー |            |

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

新型コロナワクチンの追加接種（3回目）の接種券は順次送付しています。

また、使用するワクチンは国の配分により、市内医療機関で接種する場合も下記のように、武田／モデルナ社ワクチンが入ってきます。いずれのワクチンを使用しても、安全性・抗体価が十分上昇することが確認されています。

## ◎市内医療機関で接種可能なワクチン

R4.1.17 現在

|           | R3.12月             | R4.1月 | 2月                 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月以降     |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|----|--------|----|----------|
| 接種可能なワクチン | ファイザー社             |       | 武田／モデルナ社           |    | ファイザー社 |    | 武田／モデルナ社 |
| ワクチン供給状況  | ファイザー社<br>武田／モデルナ社 |       | 5,850回分<br>4,650回分 |    |        |    |          |

## よくあるご質問

### Q. 武田／モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A. 武田／モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

（注）接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。

出典：特例承認に係る報告書より

### Q. ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A. 1・2回目の接種では、ファイザー社と武田／モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果（※）が維持されています。

ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田／モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有意に高かったと報告されています。

（※）重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv. 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

オミクロン株であっても、基本的な感染対策は変わりません。特に、エアロゾル感染対策として常時の換気と不織布マスクの適切な着用をお願いします。併せて、入念な手洗いや「密」の回避、黙食の徹底など基本的な感染防止対策もお願いします。  
(大分県ホームページより抜粋)



津久見市役所 健康推進課  
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム TEL 82-9523(直通)