

こどもの予防接種

～こどもを感染症から守るために、予防接種を受けましょう～

定期予防接種は定められた
接種期間であれば

無料で接種できます

【注意事項】

- ・大分県内の契約医療機関であれば同様に接種できます。
- ・体調の良い時に予防接種しましょう。
- ・予防接種する前には説明書を読んでおきましょう。母子健康手帳も持って行きましょう。

【日本脳炎特例対象者】

平成7（1995）年4月2日～平成19年（2007）年4月1日生まれの人で、4回の接種を受けていない人は、20歳未満であれば定期接種として残りの回数分を受けることが可能です。
また、平成19（2007）年4月2日～平成21（2009）年10月1日生まれの人に対しても、9歳～13歳未満の間に、第1期（3回）の不足分を定期接種として接種できます。

【令和2年10月1日から異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔ルールが一部変更されました】

★接種間隔における3つのルール★

- ①注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの接種までは**27日以上の間隔**をおく
 - ②同じ種類のワクチン接種を複数回受ける場合は、**ワクチンごとに決められた間隔**を守る
 - ③発熱や接種部位の腫れがないこと、体調が**良いこと**を確認し、かかりつけ医に相談の上、接種すること
- 3つのルールを守れば、次のワクチンの接種を受けるまでの間隔に制限はありません。（新型コロナウイルスを除く）
進め方は、かかりつけ医にご相談ください。

四種混合予防接種の追加接種まで終了（計4回）しているお子さんが対象です。終了していないお子さんは不足分の接種終了後、6月あけて接種します。

定期予防接種

対象疾病	接種対象年齢	望ましい接種時期	回数等	
B型肝炎	1歳に至るまで ※母子感染予防（HBs抗原陽性の母親からの出生児に対する接種）の対象となる児は定期接種対象外となります。	生後2月から生後9月に至るまで	初回2回	27日以上
			追加1回	1回目から139日以上
ヒブ感染症 （インフルエンザ菌による化膿性髄膜炎、敗血症、喉頭蓋炎などの予防）※インフルエンザウイルスとは異なります。	生後2月から生後60月に至るまで	生後2月から生後7月に至るまで	初回3回 追加1回	27日（医師が認める場合は20日）以上 初回終了後7月から13月
			※接種開始が以下の場合は回数が異なります。 ・生後7月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合 初回2回、追加1回 ・生後12月に至った日の翌日～生後60月に至るまでの場合：1回	
小児の肺炎球菌感染症 （肺炎球菌による化膿性髄膜炎、敗血症、喉頭蓋炎や中耳炎、副鼻腔炎などの予防）	生後2月から生後60月に至るまで	生後2月から生後7月に至るまで 追加接種は、生後12月から生後15月 に至るまで	初回3回 ・生後24月までに完了 追加1回	27日以上 初回終了後60日以上
			※接種開始が以下の場合は回数が異なります。 ・生後7月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合 初回2回（生後24月までに完了）、追加1回 ・生後12月に至った日の翌日～生後24月に至るまでの場合：2回 ・生後24月に至った日の翌日～生後60月に至るまでの場合：1回	
結核（BCG）	1歳に至るまで	生後5月に達した時から生後8月に達するまで	1回	
四種混合 （ポリオ、ジフテリア、破傷風、百日咳）	1期 初回	生後3月から生後90月に至るまで	生後3月に達した時から 生後12月に達するまで	3回 20日以上
	1期 追加	生後3月から生後90月に至るまで （初回接種終了後、6月以上の間隔をおく）	初回接種終了後 12月から18月までの間隔をおく	1回 初回終了後6月以上
二種混合 （ジフテリア、破傷風）	11歳以上13歳未満	11歳に達した時から 12歳に達するまで	1回	
麻疹 風しん （MR）	1期	生後12月から生後24月に至るまで	1回	
	2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで	1回	
日本脳炎	1期 初回	生後6月から生後90月に至るまで	3歳に達した時から 4歳に達するまで	2回 6日以上
	1期 追加	生後6月から生後90月に至るまで （1期初回終了後6月以上、標準的には おむね11年を経過した時期）	4歳に達した時から 5歳に達するまで	1回
	2期	9歳以上13歳未満	9歳に達した時から 10歳に達するまで	1回
水痘 （みずぼうそう）	初回	生後12月から生後15月に至るまで	1回	
	追加	生後12月から生後36月に至るまで 初回接種終了後3月以上、標準的には6 月から12月までの間隔をおく	1回	
ロタ ウイルス （嘔吐下痢）	経口経腸生ヒトロタウイルスワクチン	生後6週～生後24週	初回接種は生後2月から出生14週 6日後まで	2回 4週間隔
	経口経腸生ロタウイルスワクチン	生後6週～生後32週		3回 4週間隔
ヒトパピローマ ウイルス感染症 （子宮頸がん予防）	2価ヒトパピローマウイルスワクチン	12歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年度の末日 までの間にある女性	中学1年生	※いずれかのワクチンかは、 医療機関によって異なります
	4価ヒトパピローマウイルスワクチン			3回
	2価ヒトパピローマウイルスワクチン	【キャッチアップ接種】 平成9年から平成17年生まれの女性は （令和4年度に17歳～25歳となる女性） 令和4年4月～令和7年3月の間定期接種として 無料で接種することができます。		※いずれかのワクチンかは、 医療機関によって異なります
	4価ヒトパピローマウイルスワクチン			3回
任意予防接種	流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	1歳以上	1歳代	1回 市内の医療機関のみ 無料 です
		5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで	1回	市内の医療機関のみ 無料 です
	インフルエンザ	生後6月から13歳未満	2回	2回接種の場合は6日以上あけます。 接種費用から1,000円を助成しています （市内の医療機関のみ助成対象で、 窓口支払い時に割り引かれております。）
		13歳以上の中学生	1回	
	三種混合（追加） （ジフテリア、破傷風、百日咳）	5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで	1回	市内の医療機関のみ 無料 です
	ポリオ（不活化、追加）	5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで	1回	市内の医療機関のみ 無料 です